



● تعليمات لفحص التصوير الجزيئي / المقطعي ●

يرجى عدم إحضار الأشياء
الثمينة

إذا كان مطلوب إجراء
الفحص بحقن الصبغة
يجب إحضار نتيجة فحص
وظائف الكلى
Creatinine

إذا كنت حاملاً أو يوجد
احتمال بأن تكوني حاملاً،
يرجى إخبار الطبيب أو الفني
المختص

الرجاء إحضار قائمة
بالأدوية التي تتناولها حالياً

يرجى إعلامنا إذا كان لديك
أي حساسية لنوع معين
من الأدوية

يرجى إعلامنا في وقت
مبكر إذا كنت بحاجة إلى
خدمات الترجمة الفورية

نصائح لسلامة
المرضى قبل
الفحص

قبل يوم واحد من الفحص

- تجنب ممارسة الرياضة أو الحركة الكثيرة لمدة ساعة قبل الفحص.
- تجنب التدخين لمدة 24 ساعة قبل الفحص.
- تناول نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لمدة 24 ساعة قبل الفحص.
- ا. تجنب السكر والبطاطس والمعكرونة والأرز والخبز والفواكه والعصير والقهوة أو منتجات الألبان مثل الحليب والآيس كريم واللبن.
- ب. تناول البيض واللحوم والأسماك والخضروات، أو أي بروتين أو الأطعمة الدهنية الأخرى.
- يمكن أن تؤخذ الأدوية الروتينية، إلا إذا صدرت إليك تعليمات بخلاف ذلك.
- إذا كنت مصاباً بالسكري، يمكنك أخذ دواء السكري قبل 4 ساعات من الفحص.
- إذا كنت مريضاً سكري وسوف تحقن بالصبغة لا تأخذ ميتافورمين أو غلوكونفاج (أدوية سكر) قبل الفحص بيوم، ولا يوم الفحص، ولا اليوم الذي يليه.
- اشرب 1 لتر من الماء قبل الفحص بليلة.
- لا تتناول الطعام بعد منتصف الليل.

في يوم الفحص

- امتنع عن التدخين قبل الفحص
- ا. يجب أن تكون المعدة فارغة ولا يسمح بتناول القهوة والشاي والحلويات والعصير والسكر، أو الإفطار قبل الفحص.
- ب. لا يسمح بالعلك، والحلوى، أو النعناع قبل الفحص
- ج. يمكنك تناول الأدوية بالماء العادي فقط (باستثناء الأنسولين أو الأدوية الأخرى عن طريق الفم لمرض السكري)
- ارتداء الملابس الدافئة والمريحة شرطية لا تحتوي على سحاب معدني أو زر معدني.

بعد الفحص

- يجب عليك شرب حوالي 5 أكواب من الماء.
- يجب على الأمهات المرضعات الانتظار لمدة 24 ساعة قبل استئناف الرضاعة الطبيعية.
- إذا كنت تشعر بأي أعراض مثل احتقان الأنف، أو حكة العينين، أو الطفح الجلدي، أو العطس، أو الأرق، أو الألم، أو الغثيان، أو التقيؤ، أو الدوخة، يرجى إبلاغ الطبيب أو الفني المختص على الفور.

